



НД РБ
7901 - 2015

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ПИМАФУЦИН® (PIMAFUCIN®)

Торговое название: ПИМАФУЦИН®

Международное непатентованное название: Натамицин

Лекарственная форма: таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

Состав:

1 таблетка содержит:

Активные ингредиенты: натамицин 100 мг;

Вспомогательные вещества: крахмал картофельный, повидон К 30, магния стеарат, лактозы моногидрат,

состав оболочки: целлюлозы ацетата фталат, триацетин, сахароза, метилпарагидроксибензоат, кальция карбонат, тальк, каолин, титана диоксид (E171), акация (гуммиарабик), желатин, опаглос 6000 (воск карнаубский, воск пчелиный белый, шеллак).

Описание: Круглые таблетки белого или почти белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: Кишечные противомикробные и противовоспалительные препараты. Антибактериальные препараты.

Код ATХ: [A07AA03]

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Противогрибковый полиеновый антибиотик фунгицидного действия. Натамицин связывает стеролы клеточных мембран, нарушая их целостность и функции, что приводит к гибели микроорганизмов. К натамицину чувствительны большинство патогенных дрожжевых грибов, особенно *Candida albicans*. Менее чувствительны к натамицину дерматофиты. Резистентность к натамицину в клинической практике не встречается. Натамицин в форме таблеток, покрытых кишечнорастворимой оболочкой, действует только в просвете кишечника.

Фармакокинетика

Натамицин не всасывается из желудочно-кишечного тракта.

Показания к применению

- кандидоз кишечника;

Противопоказания

повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы

При кандидозе кишечника взрослым назначают по 1 таблетке 4 раза в сутки в среднем в течение 1 недели.

Детям назначают по 1 таблетке 2 раза в сутки.

Продолжительность курса лечения устанавливают индивидуально. После исчезновения симптомов заболевания рекомендуется продолжать лечение еще несколько дней.

Применение у пациентов с нарушенной функцией печени и/или почек. В силу того, что натамицин не подвергается системной абсорбции и отсутствует в системном кровотоке, коррекция дозы у данной категории пациентов не требуется.

Применение у пациентов пожилого и старческого возраста. Схема применения препарата у данной категории пациентов не отличается от рекомендованной для взрослых лиц.

Влияние препарата на способность управлять транспортными средствами и работать с опасными механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с опасными механизмами.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Взаимодействие Пимафуцина с другими лекарственными препаратами не описано.

Особые указания

Дети: лекарственная форма таблетки не рекомендуется к применению у детей в возрасте младше 6 лет в связи с повышенным риском аспирации на фоне незрелости глотательного рефлекса.

Беременность и лактация

Возможно применение таблеток Пимафуцин в периоды беременности и лактации.

Побочное действие

Со стороны ЖКТ: возможны тошнота и диарея (возникающие в первые дни приема таблеток и проходящие самостоятельно в ходе лечения).

Передозировка препарата

О случаях передозировки препарата Пимафуцин не сообщалось.

Условия хранения

Хранить при температуре 15 - 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке. Форма выпуска

Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 100 мг. По 20 таблеток во флакон из коричневого стекла, закрывающийся металлической крышкой. По 1 флакону вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Владелец регистрационного удостоверения
ЛЕО Фарма А/С, Дания



Индустріипаркен 55, ДК-2750 Баллеруп, Данія

Производитель

«Астеллас Фарма Юроп Б.В.»,
Хогемаат 2, 7942 JG Меппель, Нидерланды

Претензии потребителей направлять по адресу:

ООО "ЛЕО Фармасьютикал Продактс", 125315, Россия, г.Москва, Ленинградский проспект, д.72,
кор.2.

Телефон: +7 (495) 789 11 60

Электронная почта: info.ru@leo-pharma.com

