


Перед употреблением лекарственного средства обязательно прочитайте листок-вкладыш!

**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ**  
(информация для пациента)

**ЧЕРЕДЫ ТРАВА**  
**VIDENTIS HERBA**



Регистрационный номер \_\_\_\_\_

**Форма выпуска**

Измельченное сырье.

**Общая характеристика**

Кусочки стеблей, листьев, бутонов и цветков, проходящих сквозь сито с номинальным размером отверстия 5600 мкм. Цвет зеленый, буровато-зеленый или зеленовато-фиолетовый с белыми и грязновато-желтыми вкраплениями. Запах слабый.

**Фармакотерапевтическая группа**

Прочие средства, применяемые в дерматологии.

**Фармакологические свойства**

Лекарственное средство растительного происхождения. Обладает противовоспалительным, диуретическим, потогонным и противомикробным действием.

**Показания к применению**

*Внутрь:* в комплексной терапии острых респираторных заболеваний.

*Наружно:* экссудативный диатез, пиодермия.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к препарату. При применении внутрь – беременность; период лактации; детский возраст до 12 лет; заболевания, при которых необходимо ограничение приема жидкости (например, тяжелые заболевания сердца и/или почек).

**Способ применения и дозы**

10 г (3 столовые ложки) травы заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой воды комнатной температуры, закрывают крышкой и нагревают в кипящей воде (водяной бане) 15 мин, охлаждают при комнатной температуре не менее 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь в теплом виде по ¼ - 1/3 стакана 2-3 раза в день после еды.

При наружном применении для приготовления ванн используют 1 стакан настоя на ванну. Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

**Побочное действие**

Возможны аллергические реакции. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Меры предосторожности**

Перед приемом лекарственного средства необходима консультация врача.

Если во время применения лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

*Применение при беременности и лактации.* В связи с отсутствием данных не рекомендуется применять во время беременности и лактации.

*Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.* Исследования не проводились.

*Применение у детей.* Применение у детей в возрасте до 12 лет не рекомендовано в связи с отсутствием достаточных данных.

**Передозировка**

Информация о случаях передозировки отсутствует.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Информация о взаимодействии с другими лекарственными средствами **отсутствует.**

В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

**Условия и сроки хранения**

В защищенном от света и влаги месте при температуре (15-25) °С. Хранить в недоступном для детей месте. Приготовленный настой - не более 2-х суток при температуре (8-15) °С.

**Срок годности** 3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска**

Без рецепта врача.

**Упаковка**

По 50 г в пакете бумажном в пачке. Листок-вкладыш (информация для пациента) вкладывается в пачку.

**Производитель:** ООО "Падис'С"

Республика Беларусь, 220040, г. Минск, ул. Некрасова, 35/2, тел/факс (017) 331-99-12, [www.padiss.by](http://www.padiss.by).

