


ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(информация для пациента)



Бузины черной цветки, цельное сырье 50 г в пачке
Sambuci flos

Общая характеристика:

цветки диаметром около 5 мм с тремя маленькими прицветниками, видимыми при увеличении, может присутствовать цветоножка. Пятизубчатая чашечка слабозаметная, венчик светло-желтого цвета с пятью широкоовальными лепестками, сросшимися у основания с образованием трубочки. Тычиночные нити пяти желтых тычинок чередуются с лепестками. Венчик часто отдельный или вместе с присосшими у основания тычинками. Завязь нижняя с коротким столбиком с тремя тупоконечными рыльцами.

Бузины черной цветки содержат 1,5-3% флавоноидов – производных кверцетина и кемпферола (рутин, гиперозид, астрагалин и др.), антоцианы, эфирное масло, фенольные и органические кислоты, дубильные вещества, слизи и др. соединения.

Форма выпуска. Цельное сырье.

Фармакотерапевтическая группа. Прочие средства, применяемые для лечения заболеваний органов дыхания.

Показания к применению. Симптоматическая терапия острых респираторных вирусных инфекций, в том числе гриппа. Традиционный растительный лекарственный препарат, предназначенный для использования исключительно на опыте длительного применения.

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость.

Способ применения и дозы. 5 г (1,5 столовые ложки) сырья помещают в эмалированную или другую подходящую посуду, заливают водой комнатной температуры 200 мл (1 стакан), закрывают крышкой, нагревают в кипящей воде (водяной бане) 15 мин. Охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Взрослые и дети старше 12 лет принимают внутрь в теплом виде по 1/2 стакана 2 раза в день после еды. Перед употреблением настоя рекомендуется взбалтывать.

Не рекомендован прием настоя более 1 недели. Если во время приема настоя симптомы простудного заболевания сохраняются, необходимо обратиться к врачу.

Применение во время беременности и кормления грудью. Применение не изучалось, в отсутствие данных применение беременным и кормящим женщинам не рекомендуется.

Применение у детей. Применение детям до 12 лет не рекомендуется из-за отсутствия адекватного опыта клинического применения.

Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами. Исследования не проводились.

Побочное действие. Возможны аллергические реакции. При появлении побочных эффектов сообщите об этом лечащему врачу. Это касается всех возможных побочных эффектов, в том числе не описанных в данном листке-вкладыше.

Передозировка. Не наблюдалась.

Меры предосторожности. В случае ухудшения состояния пациента, появления одышки, лихорадки или гнойной мокроты во время применения лекарственного средства, необходимо проконсультироваться с врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Не изучалось.

Срок годности. 2 года.

Условия хранения. Хранить в защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте при температуре 15°C–25°C. Приготовленный настой при температуре от 8°C до 15°C – не более 2 суток.

Условия отпуска. Отпускают без рецепта.

Упаковка. По 50 г в пачке картонной с внутренним пакетом бумажным. В каждую пачку картонную вкладывают листок-вкладыш с информацией для пациента.

Производитель. ООО «НПК Биотест».

Адрес. Республика Беларусь, 230014, г. Гродно, ул. Гожская, 2.

Тел. 8 (0152) 68-45-79.

Сайт: www.biotest.by

