


**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ**  
(информация для пациента)



**Горца птичьего трава, измельченное сырье 50 г в пачке**  
**Polygoni avicularis herba**

Общая характеристика: кусочки стеблей, листьев и цветков различной формы, проходящие сквозь сито (5600). Цвет от серовато-зеленого до зеленовато-коричневого. Запах слабый.

Горца птичьего трава содержит флавоноиды: авикулярин, кверцетин, кемпферол, гиперозид, мирицетин, лзотеолин, кверцитрин и др.; кумарины, дубильные вещества, аскорбиновую кислоту, соединения кремниевой кислоты, фенолкарбоновые кислоты: кофейную, галловую, хлорогеновую; следы эфирного масла и другие биологически активные вещества.

**Форма выпуска.** Измельченное сырье.

**Фармакотерапевтическая группа.** Прочие средства, применяемые для лечения урологических заболеваний.

**Фармакологические свойства.** Настой горца птичьего травы обладает диуретическим действием.

**Показания к применению.** Внутрь: в качестве диуретического средства в комплексной терапии заболеваний мочевыводящих путей легкой степени тяжести.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

**Способ применения и дозы.** 10 г (2 столовые ложки) сырья помещают в эмалированную посуду, заливают водой комнатной температуры 200 мл (1 стакан), закрывают крышкой, нагревают в кипящей воде (водяной бане) 15 мин. Охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь в теплом виде по 1/3 стакана 2 раза в день за 20-40 минут до еды.

Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

**Применение во время беременности и кормления грудью.** В связи с возможным повышением сократительной активности матки лекарственное средство противопоказано во время беременности. В связи с отсутствием достаточных данных принимать во время лактации не рекомендовано.

**Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами.** Информация отсутствует.

**Побочное действие.** Возможны аллергические реакции. Почечная колика. Повышение свертываемости крови. В случае возникновения нежелательных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Передозировка.** Информация о случаях передозировки отсутствует. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

**Противопоказания.** Индивидуальная непереносимость, беременность, период лактации, детский возраст до 12 лет, острые воспалительные процессы почек и мочевого пузыря, наличие в мочевых путях конкрементов более 6 мм, тромбоз, тромбофлебит, заболевания, при которых необходимо ограничение приема жидкости (например, тяжелые заболевания сердца или почек).

**Применение у детей.** Применение у детей в возрасте до 12 лет не рекомендуется в связи с отсутствием достаточных данных.

**Меры предосторожности.** Перед приемом лекарственного средства необходима консультация врача. С осторожностью следует назначать пациентам с перенесенным ранее тромбозом. Рекомендуется принимать настой через соломинку, чтобы предотвратить попадание его на зубы и повреждение эмали. Во время лечения рекомендуется соответствующее потребление жидкости.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния (повышается температура, появляются расстройства мочеиспускания, боли спастического характера, кровь в моче и др.), необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.** Препарат не должен использоваться вместе с антикоагулянтами. В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

**СОГЛАСОВАНО**  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

**Условия и сроки хранения.** В защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте при температуре 15°C–25°C. Приготовленный настой при температуре от 8°C до 15°C – не более 2 суток.

**Срок годности.** 3 года.

**Условия отпуска.** Отпускают без рецепта.

**Упаковка.** По 50 г в пачке картонной с внутренним пакетом бумажным. В каждую пачку картонную вкладывают листок-вкладыш с информацией для пациента.

**Производитель.** ООО «НПК Биотест».

**Адрес.** Республика Беларусь, 230014, г. Гродно, ул. Гожская, 2.

Тел. 8 (0152) 68-45-79.

Сайт: [www.biotest.by](http://www.biotest.by)

**СОГЛАСОВАНО**  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь