


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



ЛИСТОК – В К Л А Д Ы Ш

информация по медицинскому применению лекарственного средства

Диаротокан-ПЛЮС **настойка для наружного применения**

- Перед использованием лекарственного средства Диаротокан-ПЛЮС вы должны проконсультироваться с врачом.
- Внимательно прочитайте весь листок-вкладыш перед тем, как начать прием/использование этого лекарственного средства, так как он содержит важную для Вас информацию.
- Для достижения оптимальных результатов лекарственное средство следует использовать, строго выполняя все рекомендации, изложенные в листке-вкладыше.
- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам понадобится прочесть его снова.
- Если у вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.
- Обратитесь к врачу, если Ваше состояние ухудшилось или улучшение не наступило после проведенного лечения.
- Это лекарственное средство прописано только Вам. Не передавайте его другим лицам. Это может нанести им вред, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Название лекарственного средства Диаротокан-ПЛЮС.

Название лекарственной формы Настойка для наружного применения.

Общая характеристика Прозрачный раствор красновато-коричневого цвета. При хранении допускается выпадение осадка.

Состав лекарственного средства

на 50 мл

Диаротокан (спиртовое извлечение из смеси цветков ромашки, цветков ноготков, травы тысячелистника)

- 30 мл

Диাগиперон (настойка травы зверобоя)

- 10 мл

Шалфея лекарственного листьев настойка

- 10 мл

Содержит не менее 64 % этанола.

Фармакотерапевтическая группа

Прочие препараты для местного применения при заболеваниях полости рта.

Фармакологические свойства

Комбинированное средство на основе компонентов растительного происхождения.

Биологически активные вещества, входящие в состав настойки, обладают местным противовоспалительным действием, ускоряют процессы регенерации тканей.

Показания к применению

- в комплексной терапии воспалительных заболеваний полости рта (гингивит, стоматит, пародонтит) и глотки (фарингит, тонзиллит),
- в колопроктологии в комплексной терапии проктитов, парапроктитов, сигмоидитов, анальных трещин.


Способ применения и дозировка

Для местного применения.

Перед применением 1 чайную ложку лекарственного средства разводят в стакане воды.

При воспалительных заболеваниях глотки применяют раствор лекарственного средства 3-4 раза в день в течение 5-7 дней.

При стоматитах и других заболеваниях слизистой оболочки полости рта назначают полоскания (1-2 мин.) или аппликации (15-20 мин.) 2-3 раза в день в течение 2-5 дней. При парадонтозе после выскабливания некротического тканевого содержимого десневых карманов и удаления зубных



отложенных в карманы вводят тонкие турунды, обильно смоченные раствором лекарственного средства. Время аппликации – 20 мин. Курс лечения составляет 4-6 дней.

В виде микроклизм и наружных орошений.

Для микроклизм – 1 чайную ложку лекарственного средства разводят в 50-100 мл теплой кипяченой воды. Применяют 1-2 раза в сутки после очистительной клизмы. Курс лечения 14 дней. На область анальной трещины 1-2 раза в сутки применяют салфетки, смоченные раствором лекарственного средства (примочки).

Побочное действие

При появлении побочных эффектов сообщите об этом лечащему врачу. Это касается всех возможных побочных эффектов, в том числе не описанных в данном листке-вкладыше.

Возможны аллергические реакции (зуд кожи, кожная сыпь, экзема, контактный дерматит), анафилактические реакции, пигментация кожи.

При длительном применении может вызвать чувство горечи во рту, в некоторых случаях - фотосенсибилизирующее действие (повышенная чувствительность кожи к действию солнечного света).

Противопоказания

- повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, а также к растениям семейства астровых (сложноцветных), таким как арника, амброзия, пижма, полынь, астра, хризантема.

- период беременности и лактации.

- детский возраст до 18 лет.

- фотодерматит (в т.ч. в анамнезе).

- одновременное применение с ингибиторами МАО.

- заболевания печени, алкоголизм, эпилепсия, черепно-мозговая травма и другие заболевания головного мозга со снижением судорожного порога (при применении в виде микроклизм).

Передозировка

Возможно усиление побочных явлений.

Лечение: отмена лекарственного средства, при необходимости проводят симптоматическую терапию.

Меры предосторожности

При хранении возможно появление незначительного осадка, что не оказывает влияния на эффективность лекарственного средства.

Содержит не менее 64 % этанола. Из-за содержания этилового спирта не рекомендуется принимать лекарственное средство в течение длительного времени.

Во время лечения следует избегать прямых солнечных лучей из-за возможного развития фотосенсибилизации, особенно у лиц со светлой кожей.

Если во время применения лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Применение в период беременности и кормления грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, если Вы предполагаете, что беременны или не исключаете у себя вероятности наступления беременности, сообщите об этом своему лечащему врачу.

Лекарственное средство не рекомендуется применять при беременности и в период лактации вследствие отсутствия адекватных данных о безопасности применения данных растительных средств и содержания алкоголя.

Влияние на способность управлять автомобилем или другими механизмами

Лекарственное средство содержит этиловый спирт! В период лечения необходимо воздержаться от вождения автотранспорта и занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Дети

Лекарственное средство не предназначено для детей до 18 лет вследствие отсутствия адекватных данных о безопасности применения и содержания этанола.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Если в настоящее время или в недавнем прошлом Вы принимали ~~другие лекарственные средства~~, сообщите об этом врачу.

Клинически значимое лекарственное взаимодействие с другими лекарственными средствами не установлено.

Необходимо избегать одновременного применения других лекарственных средств, содержащих этиловый спирт.

Взаимодействия, связанные с наличием в составе этилового спирта:

- лекарственные средства, вызывающие дисульфирамоподобную реакцию (ощущение жара, покраснение кожных покровов, рвота, тахикардия) при совместном приеме с алкоголем: дисульфирам, цефамандол, цефоперазон, латамоксеф, хлорамфеникол, хлорпропамид, глибенкламид, глипизид, толбутамид и другие гипогликемические препараты, гризеофульвин, метронидазол, орнидазол, тинидазол, кетоконазол, прокарбазин.

- лекарственные средства, угнетающие функции центральной нервной системы.

В связи с содержанием травы зверобоя не рекомендовано одновременное применение с антидепрессантами, бета-симпатомиметиками, другими фотосенсибилизаторами (например, тетрациклин, сульфаниламиды, тиазиды, хинолоны, пироксикам).

Дубильные кислоты, присутствующие в зверобое могут препятствовать всасыванию железа.

Зверобой повышает активность цитохрома CYP3A4 системы P450.

Зверобой может существенно влиять на плазменные концентрации любого препарата, который метаболизируется системой цитохрома P450, например, таких как:

- дигоксин (возможно уменьшение эффективности дигоксина, а после прекращения приема препаратов зверобоя - усиление токсичности дигоксина);

- теofilлин (зверобой уменьшает концентрацию теofilлина в плазме крови у пациентов, регулярно получающих теofilлин);

- пероральные контрацептивы, содержащие этинилэстрадиол и левоноргестрел (имеется сообщение о развитии ациклического кровотечения при одновременном применении зверобоя с пероральными контрацептивами, содержащими комбинацию этинилэстрадиола и левоноргестрела);

- селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (возможно усиление эффектов и развитие серотонинового синдрома (повышенное потоотделение, тремор, покраснение, спутанность сознания, агитация);

- ингибиторы MAO (возможно усиление эффектов и развитие гипертонического криза);

- циклоспорин (возможно уменьшение концентрации циклоспорина в плазме крови).

Условия и срок хранения

В защищенном от света месте при температуре от 15 °С до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности - 2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Без рецепта врача.

Упаковка

50 мл во флаконы из стекломассы оранжевого цвета с листком-вкладышем в упаковке №1.

Производитель

СОАО «Ферейн»,

Республика Беларусь, 220014, г. Минск, пер. С. Ковалевской, 52 а,

тел. + 375 17 213-16-37, +375 17 213-12-58; тел./факс + 375 17 222-92-18.