

## ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

### Черника с лютеином

**Торговое название:** Черника с лютеином.

**Лекарственная форма:** капсулы.

**Состав:** антоцианидинов - 44,25 мг (в виде черники экстракта сухого стандартизованного (25 % антоцианидинов), лютеина – 6,0 мг с содержанием зеаксантина – 0,3 мг (в виде FloraGLO лютеина 20 % SAF), зеаксантина – до 1,2 мг (в виде зеаксантина 20 % FS).

**Вспомогательные вещества:** лецитин (Солек В-10, соевый жидкий), воск пчелиный желтый, подсолнечное масло.

**Состав оболочки капсулы:** желатин, глицерин, титана диоксид Е-171, вода очищенная, натрия бензоат Е-211, красители: бриллиантовый голубой Е-133, оксид железа черный Е-172, кармуазин Е-122.

**Описание.** Капсулы мягкие желатиновые овальной формы со швом, упругие, темно-фиолетового цвета.

**Фармакотерапевтическая группа:** Прочие офтальмологические средства.  
Код АТС S01XA.

#### **Показания к применению**

В составе комплексного лечения:

- миопии;
- диабетической ретинопатии;
- гипертонической ретинопатии;
- нарушений механизмов адаптации зрения к темноте, как при ночном, так и при сумеречном зрении;
- дистрофических заболеваний сетчатки;
- возрастной макулярной дегенерации сетчатки;
- катаракты;
- окклюзии сосудов сетчатки;
- зрительной астенопии;
- состояния после оперативного вмешательства (ФРК, отслойка сетчатки и др.).

Профилактика ухудшения зрения при повышенной зрительной нагрузке, для уменьшения признаков зрительного утомления, при работе связанной с воздействием яркого света (сварка, софиты).

#### **Способ применения и дозы**

Внутрь. Взрослым назначают по 1 капсуле 2-3 раза в сутки после еды в течение месяца, затем по 1 капсуле 1 раз в день в течение последующих двух месяцев. Рекомендованный курс приема 2-3 раза в год.

#### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции к компонентам лекарственного средства.

### **Меры предосторожности**

Адекватных и хорошо контролируемых клинических исследований безопасности и эффективности применения лекарственного средства у детей до 18 лет не проводилось.

### **Беременность и лактация**

Адекватных и хорошо контролируемых клинических исследований безопасности и эффективности применения лекарственного средства в период беременности и лактации не проводилось.

### **Передозировка**

О случаях передозировки лекарственного средства не сообщалось.


При случайной передозировке показан прием активированного угля, промывание желудка; при необходимости проводят симптоматическую терапию.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Не описано.

### **Противопоказания**

Противопоказаниями к применению является **повышенная чувствительность** к компонентам лекарственного средства.



### **Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами**

Не влияет.

### **Упаковка**

Мягкие желатиновые капсулы овальной формы со швом, упругие, темно-фиолетового цвета, по 10 капсул в контурной ячейковой упаковке, по 2 или 3 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем в пачке.

### **Условия хранения**

Хранят в защищенном от влаги и света месте при температуре от 15 °С до 25 °С.

Хранят в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

2 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия отпуска**

Отпуск производится без рецепта врача.

Название и адрес производителя:

УП «Минскинтеркапс», Республика Беларусь,  
220075, г. Минск, а/я 112, ул. Инженерная, д. 26  
тел./факс (+ 37517) 276-01-59  
e-mail: [info@mic.by](mailto:info@mic.by), [www.mic.by](http://www.mic.by)