



**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ**  
(информация для пациента)  
по медицинскому применению лекарственного средства

**Бессмертника песчаного цветки, цельное сырье 30 г в пачке**  
(*Helichrysi arenarii flos*)

*Прочитайте внимательно этот листок-вкладыш перед тем, как начать применение лекарственного средства.*

*Сохраняйте этот листок – вкладыш. Вам может понадобиться перечитать его еще раз.*

*Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом.*

**Торговое название.** Бессмертника песчаного цветки.

**Международное непатентованное название (МНН).** Отсутствует.

**Форма выпуска.** Цельное сырье.

**Состав.** Бессмертника песчаного цветки, 30 г.

**Описание.** Корзинки шаровидные, одиночные или по несколько вместе на коротких шерстисто-войлочных цветоносах длиной до 1 см, диаметром около 7 мм. Цвет обвертки зеленовато-желтый, цветков — зеленовато- желтый или оранжевый. Запах слабый, ароматный. Вкус пряно-горький.

*Бессмертника песчаного цветки содержат флавоноидные гликозиды, флавоноиды, дубильные вещества, каротиноиды, полисахариды, следы эфирного масла и другие биологически активные вещества.*

**Фармакотерапевтическая группа.** Прочие средства, применяемые для лечения заболеваний желчевыводящих путей.

**Фармакологические свойства.** Лекарственное средство оказывает желчегонное действие, обладает диуретическими свойствами, стимулирует секреторную функцию желудка и поджелудочной железы.

**Показания к применению:**

В комплексной терапии хронического некалькулезного холецистита и

дискинезии желчевыводящих путей.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

**Способ применения и дозировка.** ~~10 г цветков (3 столовые ложки)~~ **СОГЛАСОВАНО** ~~указанием Министерства здравоохранения РБ № 300 от 10.03.2000 г.~~ (1 стакан) воды комнатной температуры, нагревают в ~~кипящей водяной бане~~ **при частом помешивании** 30 мин, охлаждают ~~10 минут~~ **Приказом Министерства здравоохранения РБ № 300 от 10.03.2000 г.**, процеживают, отжимают и добавляют кипяченой воды до 200 мл.

Принимают отвар внутрь по 1 столовой ложке 3-4 раза в день за 15-30 минут до еды. Перед употреблением отвар рекомендуется взбалтывать.

Кратность приема и длительность курса лечения определяются врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

*Особенности применения у пациентов с нарушениями функции почек:* информация отсутствует.

*Особенности применения у пациентов с нарушениями функции печени:* см. разделы «Противопоказания» и «Меры предосторожности».

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.** Данные о взаимодействиях с другими лекарственными средствами ограничены. В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

#### **Противопоказания.**

Повышенная чувствительность к бессмертнику, а также к растениям семейства астровых (сложноцветных), таким как, ромашка, арника, амброзия, тысячелистник, пижма, полынь, астра, хризантема.

Желчекаменная болезнь, обтурационная желтуха, острые воспалительные заболевания печени, желчного пузыря и поджелудочной железы, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит в стадии обострения. Беременность, период лактации, детский возраст до 18 лет.

#### **Побочное действие.**

Возможные аллергические реакции, появление горечи во рту, диспепсия, усиление диуреза.

При длительном применении возможно развитие холестаза.

В случае возникновения нежелательных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

#### **Меры предосторожности.**

Перед приемом лекарственного средства необходима консультация врача.

Из-за возможной стимуляции секреции желчи лекарственное средство не следует принимать в случае обструкции желчевыводящих путей, желчнокаменной болезни, холангита, острых воспалительных заболеваний

печени, желчного пузыря и поджелудочной железы.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

**Применение в период беременности и кормления грудью** не рекомендуется. Согласовано с Министерством здравоохранения Республики Беларусь. В связи с отсутствием достаточных данных применения в период беременности и кормления грудью не рекомендуется.

*Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.* Исследования по оценке влияния применения лекарственного средства на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились.

**Применение у детей.** Применение у детей до 18 лет не рекомендуется в связи с отсутствием достаточных данных.

### **Передозировка.**

Длительное применение лекарственного средства может привести к развитию застоя желчи. В случае появления симптомов передозировки необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

**Условия хранения.** В защищенном от влаги и света месте при температуре от 15 °C до 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.

Приготовленный отвар – в прохладном месте (при температуре от 8 °C до 15 °C) не более 2 суток.

**Условия отпуска из аптек.** Отпускают без рецепта врача.

**Срок годности.** 4 года.

*Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.*

**Упаковка.** Пакеты бумажные по 30 г. Пакет бумажный с листком-вкладышем помещают в картонную пачку.

**Производитель.** ЗАО «БелАсептика», Республика Беларусь, Минский район, деревня Цнянка, военный городок 137«А», административное здание ЗАО «БелАсептика», комната 7. Тел. (017) 500 33 11, тел./факс (017) 500 33 46.