


7040 - 2018

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

ЖЕЛУДОЧНЫЙ СБОР № 3
(STOMACHICAE SPECIES № 3)

Состав лекарственного средства. 1 г сбора содержит: крушины коры 0,3 г, крапивы листьев 0,3 г, мяты перечной листьев 0,2 г, валерианы корневищ с корнями 0,1 г, аира корневищ 0,1 г.

Желудочный сбор № 3 содержит флавоноиды, каротиноиды, гликозиды, эфирное масло, органические кислоты (изовалериановую, муравьиную, аскорбиновую и др.), дубильные вещества, сапонины, антрагликозиды, свободные антранолы, смолистые вещества, терпеноиды, минеральные и другие биологически активные вещества.

Форма выпуска. Сбор (порошок крупный).

Фармакотерапевтическая группа. Прочие средства для лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта.

Фармакологические свойства. Биологически активные вещества сбора оказывают легкое слабительное, спазмолитическое, седативное, противовоспалительное, желчегонное действие.

Показания к применению. *Внутрь:* симптоматическое средство при функциональных расстройствах пищеварительного тракта; кратковременное применение в случае эпизодических запоров.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, а также к ментолу.

Беременность, период лактации, детский возраст до 18 лет.

Спастический запор, хронические запоры, стеноз и атония кишечника, кишечная непроходимость, боли в животе неизвестной этиологии, аппендицит, перитонит, ущемленная грыжа, острые и хронические воспалительные заболевания кишечника (язвенный колит, болезнь Крона, синдром раздраженного кишечника, энтерит, колит), гастрит, повышенная кислотность желудочного сока, желудочно-кишечные и маточные кровотечения, диарея, дегидратация и электролитные нарушения, гломерулонефрит, нарушения функции почек, геморрой, трещины прямой кишки. Выраженная артериальная гипотензия, желчнокаменная болезнь, желудочно-пищеводный рефлюкс.

Меры предосторожности. Применение сбора не рекомендовано пациентам с повышенной свертываемостью крови, кровотечениях, при заболеваниях, требующих оперативного вмешательства, опухолях, пациентам с желудочно-пищеводным рефлюксом. Не следует применять женщинам в период менструации.

Пациентам с заболеваниями печени, желчнокаменной болезнью и другими заболеваниями желчевыводящих путей перед приемом сбора необходимо обратиться к врачу.

Слабительные средства не следует применять в случае недиагностированных болей в животе, тошноты, рвоты без консультации врача, поскольку эти симптомы могут быть признаками кишечной непроходимости и других заболеваний. Если потребность в приеме слабительных средств возникает ежедневно, необходимо обратиться к врачу.

Сбор может применяться только, если необходимый эффект не получен за счет изменения рациона питания или использования слабительных средств, увеличивающих объем кишечного содержимого.

Сбор без консультации с врачом не должен приниматься в течение более одной недели в связи с риском развития электролитного дисбаланса. Длительный прием может привести к дисфункции толстой кишки (атонии) и усугублению запора. Злоупотребление слабительными средствами приводит к диарее, нарушениям водно-электролитного баланса (главным образом, гипокалиемия).

В случае назначения сбора пациентам с недержанием кала, следует часто менять прокладки для предотвращения контакта кожи с калом.

Кровотечение из прямой кишки или отсутствие дефекации после приема слабительного средства может указывать на наличие серьезного заболевания. Если симптомы сохраняются на фоне приема лекарственного средства или происходит ухудшение состояния, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Ускорение транзита кишечного содержимого может привести к снижению всасывания принимаемых внутрь лекарственных средств.

Электролитный дисбаланс (гипокалиемия) может влиять на эффекты сердечных гликозидов, антиаритмических средств (например, хинидина) и лекарственных средств, вызывающих удлинение интервала QT.

Одновременное применение диуретиков, кортикостероидов, корня солодки повышает вероятность развития электролитных нарушений.

Не рекомендован совместный прием сбора с синтетическими седативными средствами.

В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Применение в период беременности или кормления грудью. В связи с отсутствием достаточных данных принимать во время беременности и кормления грудью противопоказано.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Исследования не проводились.

В связи с возможным седативным эффектом во время лечения не рекомендовано управлять автотранспортом и работать с механизмами.

Дети. Применение у детей в возрасте до 18 лет противопоказано в связи с отсутствием достаточных данных.

Способ применения и дозы.


1 фильтр-пакет помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипящей воды, закрывают крышкой и настаивают 30 мин. Фильтр-пакет отжимают.

Перед употреблением водное извлечение рекомендуется взбалтывать.

Принимать в теплом виде взрослым по 1/2 стакана (100 мл) 2 раза в сутки за 15-20 минут до еды.

Рекомендовано принимать наименьшую дозу, достаточную для достижения необходимого эффекта.

Не рекомендовано принимать лекарственное средство более одной недели без консультации врача. Длительность лечения определяет врач индивидуально для каждого пациента.



Передозировка. Основные симптомы передозировки – боль в животе и сильная диарея с последующей потерей жидкости и электролитов. Прием корня валерианы в дозе около

20 г может вызвать развитие болей в животе спастического характера, чувства стеснения в груди, головокружения, тремора рук и расширения зрачков. При передозировке возможны также нарушения дыхания и усиление седативного эффекта.

Хроническая передозировка вызывает чувство угнетенности, головную боль, сонливость, снижение работоспособности, диарею, дискомфорт со стороны желудочно-кишечного тракта, электролитные расстройства, нарушения сердечной деятельности. В связи с содержанием коры крушины при длительном применении больших доз может развиваться токсический гепатит.

В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Побочное действие. Возможны реакции гиперчувствительности (зуд, кожная сыпь, крапивница, отеки), дискомфорт, боли в животе спастического характера, диспепсия, метеоризм, тенезмы, тошнота, рвота, диарея, жидкий водянистый стул.

Вследствие гастроэзофагеального рефлюкса может усиливаться изжога.

У пациентов с холелитиазом лекарственное средство может вызвать желчную колику.

Возможно возникновение головной боли, общей слабости, снижения работоспособности, сонливости, раздражительности, тревожности. Большие дозы могут привести к брадикардии и аритмии.

После приема лекарственного средства моча может приобретать желто-коричневый или красно-коричневый цвет, что не является клинически значимым.

В случае передозировки могут развиваться нарушения водно-электролитного баланса, альбуминурия, гематурия.

В случае возникновения нежелательных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Условия и срок хранения. Хранить при комнатной температуре (15-25 °С) в защищенном от влаги, света и недоступном для детей месте. Водное извлечение использовать свежеприготовленным. Срок годности – 2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Упаковка. В фильтр-пакетах 1,5 г в упаковке № 20.

Правила отпуска. Без рецепта.

Название и адрес производителя. ЧАО «Лектравы»,
Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.

