


3523 - 2020

**Инструкция  
(информация для пациента)  
по медицинскому применению препарата  
Лома Люкс Псориаз  
(Loma Lux Psoriasis)**

**Торговое название:** Лома Люкс Псориаз.

**Лекарственная форма:** раствор для приема внутрь.



**Состав**

237 мл бутылка содержит: калия бромид D1 0,83 г, натрия бромид D2 0,71 г, никеля сульфат D3 0,14г, цинка бромид D4 0,004 мг, калия сульфат D4 0,00095 г, вспомогательные вещества: спирт этиловый 4,74мл, метилпарабен 0,3555г, пропилпарабен 0,0711г, вода очищенная до 237 мл.

**Описание**

Прозрачный, бесцветный или с бледно голубоватым-зеленым оттенком раствор. Допускается хлопьевидный осадок.

**Фармакотерапевтическая группа:** Прочие лекарственные средства.  
**Код АТС:** V03AX.

**Область применения**

Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических (медицинских) показаний к применению. Применяется в комплексном лечении различных форм псориаза.

**Способ применения и режим дозирования**

Препарат назначают 1 раз в сутки(утром) натощак за 1 час до приема пищи. После приема препарата следует избегать приема пищи и жидкости (кроме воды) в течение 1 часа.

Масса тела	Кол-во препарата
Менее 45 кг	0,5 чайной ложки (2,5 мл)
45-68 кг	1 чайная ложка (5 мл)
68-90 кг	1 – 1,5 чайные ложки (7,5 мл)
Более 90 кг	2 чайные ложки (10 мл)

Продолжительность курса лечения составляет 4-5 месяцев.

Длительность терапии определяется врачом индивидуально в зависимости от достигнутого эффекта и переносимости препарата.

**Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и пищевыми продуктами**  
Не установлено клинически значимого лекарственного взаимодействия Лома Люкс Псориаз с другими лекарственными средствами.

**Побочные эффекты**

Возможны аллергические реакции, в т.ч. кожная сыпь. При появлении побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, гломерулонефрит, детский возраст до 18 лет, беременность и период грудного вскармливания.

3523 - 2020

**Меры предосторожности**

При применении препарата следует исключить прием алкоголя и употребление арахиса и содержащих его продуктов, ограничить употребление острых, сладких, жареных и аллергогенных продуктов (цитрусовые, шоколад, газированные напитки).

Пациент должен быть проинформирован о том, что при развитии аллергической реакции прием препарата следует прекратить и проконсультироваться с врачом.

Лекарственное средство содержит не менее 1,8% (об/об) этилового спирта. Максимальная суточная доза содержит около 0,155г спирта этилового. Следует соблюдать осторожность при использовании препарата у пациентов с заболеваниями печени, алкоголизмом, черепно-мозговой травмой, заболеваниями головного мозга».

При отсутствии терапевтического эффекта в течение одного месяца приёма препарата следует обратиться к врачу.

Препарат не следует применять при заболеваниях почек.

У пациентов с аллергией на никель или бижутерию, лекарственное средство следует использовать только под наблюдением врача.

Если во время лечения появляется кожная сыпь, возникают постоянные, повторяющиеся или необычные симптомы со стороны нервной системы, следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Препарат содержит метилпарабен и пропилпарабен, которые могут вызывать аллергические реакции (в том числе, отсроченные) и, в исключительных случаях, бронхоспазм».

**Передозировка**

При приеме лекарственного препарата токсические эффекты могут наблюдаться в случае острой передозировки у человека с очень низким весом (менее 7 кг). 1 бутылка «ЛОМА ЛЮКС ПСОРИАЗ» содержит около 53 мг никеля. В случае подозрения на передозировку, необходимо обратиться к врачу, рекомендуется прием воды для стимуляции выведения никеля и медицинское наблюдение.

**Применение при беременности и лактации**

Препарат не следует применять в период беременности или кормления грудью.

**Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами**

Лекарственное средство содержит этиловый спирт. При применении лекарственного средства следует соблюдать осторожность при вождении автомобиля и работе с движущимися механизмами.

**Информация о пропуске приёма**

В случае пропуска приёма следует продолжить курс лечения не оснований указанных доз и способа применения.

**Условия хранения**

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C.

**Условия отпуска**


Без рецепта.

**Срок годности**

Срок годности 5 лет. Не использовать по истечения срока годности, указанного на упаковке.

НД РБ

3523 - 20



**Форма выпуска и упаковка**

По 237 мл раствора в бутылку полимерную. Бутылка полимерная ~~закупорена пробкой и~~ защитным кольцом. Каждую бутылку полимерную вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

**Фирма-производитель, страна**

Лома Люкс Лэборэториз/ Ботэнкэл Лэборэториз Инк, США.