



ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

АММИАК
Ammonia

Состав лекарственного средства:

действующее вещество: аммиака раствор концентрированный;

1 мл препарата содержит аммиака раствора концентрированного (25 %) – 0,44 мл;

вспомогательное вещество: вода очищенная.

Лекарственная форма. Раствор для наружного применения 10%.

Прозрачная, бесцветная, летучая щелочная жидкость с резким запахом.

Название и адрес производителя.

ООО «ДКП «Фармацевтическая фабрика».

Украина, 10014, г.Житомир, ул. Лермонтовская, 5.

Фармакотерапевтическая группа.

Средства, влияющие на респираторную систему. Код АТС R07A B12*.

Раствор аммиака относится к лекарственным средствам, раздражающим нервные окончания. Механизм действия аммиака при вдыхании заключается в рефлекторном возбуждении дыхательного центра через рецепторы верхних дыхательных путей – окончаний тройничного нерва.

При нанесении на кожу оказывает раздражающее и антимикробное действие. Препарат не попадает в кровеносное русло.

Показания к применению.

Обморочное состояние, при укусах насекомых.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к лекарственному средству.

Меры безопасности при применении.

Местное применение возможно только на неповрежденную кожу.

При случайном попадании на слизистую оболочку глаза промывать водой несколько раз (в течении 15 минут с перерывом 10 минут) или 3% раствором борной кислоты. Масла и мази не применяют. При поражении носа и глотки применяют 0,5% раствор лимонной кислоты или натуральные соки. В случаях приема внутрь – пить воду, фруктовый сок, молоко, лучше - 0,5% раствор лимонной кислоты или 1% раствор уксусной кислоты до полной нейтрализации содержимого желудка.

Не следует нарушать правила применения лекарственного средства, это может навредить здоровью.

Особые меры предосторожности.

Применение в период беременности или кормления грудью.

В период беременности и кормления грудью применение препарата возможно лишь в том случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Не влияет.

Дети.

Препарат не применяют детям до 3 лет.

Способ применения и дозы.

Для возбуждения дыхательного центра, как средство первой помощи: небольшой кусочек марли или ваты, смоченный раствором аммиака, осторожно подносят к носовым отверстиям на 0,5 - 1с.

При укусах насекомых раствор аммиака применяют наружно в виде примочек (продолжительность процедуры – до 30 секунд).

Передозировка.

Усиление проявлений побочных реакций. Терапия симптоматическая.

Побочные эффекты.

При вдыхании паров раствора аммиака может возникнуть рефлекторная остановка дыхания. При местном применении возможны раздражения, дерматиты, экзема в месте аппликации, аллергические реакции.

В случае проявления каких-либо нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействия.

Не установлено.

Срок годности.

2 года.

Препарат не следует применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения.

Хранить при температуре не выше 25°C в недоступном для детей месте.

Упаковка.

По 40 мл во флаконах с прикрепленной (к каждому флакону) инструкцией по медицинскому применению или по 40 мл во флаконе в упаковке №1.

Категория отпуска.

Без рецепта.