

4512 - 2018

WROCLAWSKIE ZAKLADY ZIELARSKIE

"Heldagrod"

SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Św. Mikołaja 65/68, skr. poczt. 1040

50-100 WROCLAW 3

**ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ**

(информация для потребителя)

**ВЕНЕСЦИН (VENESCIN®)****СОГЛАСОВАНО**

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусьот «20» 12 2018 г. № 1365КЛС № 12 от «03» 12 2018 г.**Торговое название препарата:**

ВЕНЕСЦИН (VENESCIN®)

**Лекарственная форма и назначение:**

Драже зеленого цвета, блестящие, без пятен, круглые, двояковыпуклые.

**Состав:****1 драже содержит:****Действующие вещества:**

Экстракт сухой семян конского каштана

*(Hippocastani semen extractum siccum)* (5,5-8:1)

со средним содержанием 22% тритерпеновых сапонинов

в пересчете на безводный эсцин

25,0 мг

(экстрагент: 70% V/V этанол)

Рутин

15,0 мг

*(Rutosidum)*

Эскулин

0,5 мг

*(Aesculinum)***Вспомогательные вещества:**

картофельный крахмал	10,495 мг
стеарат магния	1,20 мг
канифоль	1,25 мг
касторовое масло	0,125 мг
аравийская камедь	1,60 мг
тальк	10,33 мг
сахароза	34,49 мг
индигодин (E132)	0,0025 мг
хинолиновый желтый (E104)	0,0075 мг

**Форма выпуска:**

30 драже в блистере из ПВХ/ал., упакованном в картонную коробку с листком-вкладышем.

**Фармакотерапевтическая группа в системе АТХ: C05CA.**

Средства, снижающие проницаемость капилляров (Ангиопротекторы).

Код АТХ C05CA.

**Фармакологические свойства:**

Препарат Венесцин содержит в своем составе экстракт семян конского каштана, рутозид и эскулин. Считается, что применение препарата повышает тонус вен, снижает проницаемость и повышает устойчивость капилляров.

**СОГЛАСОВАНО**  
 МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
 Приказ Министерства здравоохранения  
 Республики Беларусь

4512 - 2018  
 WROCLAWSKIE ZAKŁADY ZIELIARSKIE  
 „Herbapol”  
 SPÓŁKA AKCYJNA  
 ul. św. Mikołaja 55/65, skt. poczt. 1040  
 50-951 WROCLAW 3

**Показания к применению:**

Лекарственное средство растительного происхождения, предназначенное для лечения хронической венозной недостаточности у взрослых, характеризующейся болями и чувством тяжести, усталости, сдавливания в ногах, отеками, варикозным расширением вен, зудом и судорогами.

**Способ применения и дозы:**

Перорально.

Дозы

*Взрослые*

По 2 драже 3 раза в сутки.

*Дети и подростки*

Не применять лекарственное средство детям и подросткам до 18 лет.

Продолжительность применения

Если по истечении 21-го дня симптомы усилятся, не произойдет улучшения или Вы почувствуете себя хуже, следует обратиться к врачу.

**Побочное действие:**

Побочные эффекты классифицированы по частоте следующим образом: очень часто ( $\geq 1/10$ ); часто ( $\geq 1/100 - < 1/10$ ); иногда ( $\geq 1/1000 - < 1/100$ ); редко ( $\geq 1/10\ 000 - < 1/1000$ ); очень редко ( $< 1/10\ 000$ ), неизвестно (на основании имеющихся данных оценить частоту реакции невозможно).

*Со стороны кожи и подкожной клетчатки*

Редко: аллергический дерматит (зуд, сыпь, эритема, экзема, крапивница).

Очень редко: тяжелые аллергические реакции (в некоторых случаях с кровотечением).

*Со стороны нервной системы*

Иногда: головокружение, головная боль.

*Со стороны сердечно-сосудистой системы*

Очень редко: тахикардия, гипертония.

*Со стороны иммунной системы*

Очень редко: реакции гиперчувствительности.

*Со стороны желудочно-кишечного тракта*

Иногда: тошнота, рвота, диарея, ощущение дискомфорта в желудке.

*Со стороны репродуктивной системы*

Очень редко: кровотечение из влагалища.

В случае появления описанных реакций, особенно кровотечения, и первых реакций гиперчувствительности (кожная сыпь) следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

**Противопоказания:**

- Абсолютным противопоказанием к применению является тяжелая почечная недостаточность.
- Повышенная чувствительность к активному веществу или к любому из вспомогательных веществ.
- Дети и подростки до 18 лет.

**СОГЛАСОВАНО**  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

4512 - 2018  
WROCLAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE  
"Zielarski"  
SPÓŁKA AKCYJNA  
ul. św. Mikołaja 65/68, skr. poczt. 1040  
50-951 WROCLAW 3

### **Передозировка:**

Сапонины, которые содержатся в семенах конского каштана, могут при передозировке способствовать усилению известного побочного эффекта – чувства тошноты, а также могут вызвать рвоту и понос. По поводу необходимости принятия мер для устранения этих симптомов проконсультируйтесь с врачом.

### Симптомы передозировки

После употребления в пищу конского каштана наблюдались следующие признаки отравления:

беспокойство, сильная рвота и понос, мидриаз, сонливость, делирий, в отдельных случаях – смерть в связи с параличом дыхательных путей через 24-48 часов.

### Меры при передозировке и противодействующие средства

В качестве терапевтических средств рекомендуется:

- если после приема большого количества препарата рвота отсутствует, рекомендуется провести промывание желудка (например, 0,02%-ным раствором перманганата калия) и принять активированный уголь;
- в других случаях проводится симптоматическое лечение.

### **Меры предосторожности:**

В случае совместного применения препарата с антикоагулянтами необходимо контролировать параметры свертываемости крови.

Лекарственное средство необходимо принимать с осторожностью при функциональных заболеваниях печени.

Препарат может вызвать аллергические реакции, вызванные присутствием в составе желтого красителя (E104).

Если возникают аномально сильные жалобы, в особенности – на состояние ног, которое характеризуется воспалением, изменением цвета кожи, чувством напряжения или жара, уплотнениями под кожей, болями, язвами, тромбофлебитом, отеком одной или обеих ног, следует незамедлительно обратиться к врачу, так как данные симптомы могут являться признаком серьезного заболевания (тромбоза вен нижних конечностей). То же относится к признакам сердечной и почечной недостаточности.

Следует неукоснительно соблюдать назначенные врачом дополнительные неинвазивные меры, такие как компрессы на ноги, ношение лечебных чулок, обливания холодной водой и т.д. Использование препаратов эсцина не заменяет данные рекомендации.

### *Беременность и лактация:*

Препарат противопоказан к применению во время беременности, так как отсутствует достаточно данных, подтверждающих безопасность его применения у беременных женщин.

В связи с тем, что неизвестно, какая часть активного вещества попадает в молоко матери, на период приема препарата следует прекратить грудное вскармливание.

### **Управление транспортными средствами и обслуживание механизмов:**

Препарат не влияет на способность управлять механическими транспортными средствами и обслуживать движущиеся механические устройства.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Препарат может усиливать действие антикоагулянтов при совместном применении.

Некоторые антибиотики, например, цефалоспорины, могут усиливать действие лекарственного средства. Следует избегать совместного применения α-эсцина и аминогликозидов из-за возможности усиления токсического действия на почки.

**СОГЛАСОВАНО**  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

4512 - 2018  
WROCLAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE  
„Herbapol”  
SPÓŁKA AKCYJNA  
ul. św. Mikołaja 65/68, skr. poczt. 1040  
50-951 WROCLAW 3  
(2)

**Условия хранения:**

Препарат следует хранить при температуре не выше 25 °С, защищать от света и влаги.  
Хранить в недоступном и незаметном для детей месте.

**Срок годности:**

3 года. Не применять препарат по истечению срока годности. Препарат с истекшим сроком годности утилизируют в установленном порядке.

**Условия отпуска из аптек:**

Без рецепта.

**Название и адрес изготовителя:**

Вроцлавское предприятие Лекарственных Трав «Гербаполь» Акционерное общество,  
50-951 Вроцлав, ул. Св. Миколая 65/68, Польша.  
Тел. + 48 71 33 57 225

17.10.2018

---