

## ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

информация для пациента лекарственного средства


**ДОКТОР ТАЙСС АНГИ СЕПТ**

таблетки для рассасывания со вкусом шалфея

**Состав:**

1 таблетка (2,5г) содержит:

<i>активные ингредиенты</i>	мг
2,4-Дихлорбензиловый спирт	1,2
Ментол	5,4
Анетол	2,4
Масло мяты перечной	0,6

*неактивные ингредиенты*

сахароза, глюкозы сироп, шалфейный ароматизатор, лимонная кислота, сахарный краситель Е 150с, эвкалиптовое масло, вода..

**Описание.**

Круглые плоскоцилиндрические таблетки с фаской и углубленными центрами темно-коричневого цвета с неравномерным окрашиванием и характерным запахом и вкусом. Возможно наличие включений пузырьков воздуха, незначительная неровность краев и легкое прилипание к первичной упаковке.

**Фармакотерапевтическая группа:**

Антисептическое средство.

Код АТХ: R02AA20

**Фармакологическое действие:** Комбинированный противомикробный препарат для местного применения в полости рта и глотки. Обладает антисептическим действием. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.

**Показания к применению:**

Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки (боль при глотании).

**Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Детский возраст до 6 лет.

**Способ применения и дозы:**

Взрослым и детям старше 6 лет каждые 2-3 часа медленно рассасывать во рту 1 таблетку, но не более 6 таблеток в сутки. Продолжительность лечения не более 2-3 дней.

**Побочные действия:**

Возможны аллергические реакции кожи, дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта.

**Передозировка:**

Маловероятна, возможная передозировка может привести к симптомам дискомфорта со стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота). Лечение симптоматическое.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Клинически значимых взаимодействий с другими препаратами не выявлено.

**Меры предосторожности**

Препарат не рекомендуется принимать при кровоточащих ранах в полости рта и горла, но в случае приема таблетку следует рассасывать с осторожностью.

Непосредственно после приема препарата следует воздержаться от приема пищи и жидкости.

Если симптомы заболевания сохраняются более 3-х дней, врач должен уточнить диагноз и (при необходимости) скорректировать схему лечения.

Пациенты с редкими наследственной непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией или сахарозной-изомальтазной недостаточностью не должны принимать Анги Септ.

1 таблетка содержит 962,0 мг глюкозы и 1443,0 мг сахарозы, что соответствует около 0,2 хлебных единиц (ХЕ). Это следует учитывать пациентам с сахарным диабетом.

**Применение в период беременности и кормления грудью**

Безопасность применения лекарственного средства во время беременности и кормления грудью не установлена, применение лекарственного средства возможно только по назначению врача после оценки соотношения пользы и риска для матери и плода/ребенка.

**Влияние на способность управлять автомобилем или другими механизмами**

Не влияет на способность управлять автотранспортом или работать с движущимися механизмами.

**Форма выпуска:**

По 12 таблеток в блистер из ПВХ, покрытый алюминиевой фольгой; 1 или 2 блистера с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

**Условия хранения:**

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности:**

5 лет. Не использовать по истечении срока годности.

**Условия отпуска из аптек:**

Без рецепта.

**Производитель:**

Др. Тайсс Натурварен ГмбХ Мишелинштрассе 10,  
66424 Хомбург, Германия

**Представительство в Республике Беларусь:**

ИООО "НАТУСАНА" 220114 Минск,

ул. Франциска Скорины, 8-29.

тел./факс (017) 399-69-65

