

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению (листок-вкладыш)
лекарственного препарата

ПИМАФУЦИН®

крем для наружного применения 2%
натамицин

Данная инструкция содержит важную информацию. Внимательно прочтите ее до начала применения препарата.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникнут дополнительные вопросы по применению препарата, обратитесь к врачу или фармацевту.
- Данный лекарственный препарат назначен лично Вам. Не передавайте его другим людям. Препарат может причинить им вред, даже если их симптомы такие же, как у Вас.
- Если у Вас возникнет какой-либо побочный эффект или Вы заметите побочные эффекты, не указанные в этой инструкции, сообщите об этом Вашему врачу или фармацевту (см. раздел 4).

Данный листок-вкладыш содержит следующую информацию:

1. Что представляет собой препарат Пимафуцин® крем и для чего его применяют
2. Что необходимо знать перед началом применения препарата Пимафуцин® крем
3. Как следует применять препарат Пимафуцин® крем
4. Возможные нежелательные реакции
5. Как следует хранить препарат Пимафуцин® крем
6. Содержимое упаковки и другая информация

1. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРЕПАРАТ ПИМАФУЦИН® КРЕМ И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Натамицин, действующее вещество крема Пимафуцин®, является противогрибковым полиеновым антибиотиком широкого спектра действия. Он применяется для лечения кожных инфекций, вызванных грибами, в частности *Candida albicans*.

Препарат может применяться пациентами всех возрастных групп.

2. ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ПИМАФУЦИН® КРЕМ

Не применяйте препарат Пимафуцин® крем:

- если у Вас аллергия на натамицин или другие компоненты данного лекарственного препарата, перечисленные в разделе 6.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением крема Пимафуцин® проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Не допускайте попадания крема в глаза.

Применение препарата Пимафуцин® крем с другими лекарственными средствами

Проинформируйте врача или фармацевта о том, что Вы принимаете или недавно принимали другие лекарственные препараты, в том числе отпускаемые без рецепта.

Пимафуцин® крем содержит вспомогательные вещества

Данный лекарственный препарат содержит 15 мг натрия лаурилсульфата на грамм. Натрия лаурилсульфат может вызывать местные кожные реакции (покалывание или жжение) или усиливать кожные реакции, вызванные другими продуктами, применяемыми на той же поверхности кожи.

Метилпарагидроксибензоат (E218) и пропилпарагидроксибензоат (E216) могут вызывать аллергическую реакцию (возможно, замедленную).

Пропиленгликоль может вызывать раздражение кожи. Не применяйте препарат у новорожденных (младше 4 недель) с открытыми ранами или обширными участками поврежденной кожи (например, ожогами) без консультации с врачом или фармацевтом.

Беременность и лактация

В случае беременности или кормления грудью, а также при предполагаемой или планируемой беременности необходимо до применения препарата проконсультироваться с врачом или фармацевтом.

Данные о негативном влиянии препарата на плод отсутствуют. Пимафуцин® крем может применяться во время беременности и грудного вскармливания.

Влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами

Пимафуцин® крем не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

3. КАК СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ПРЕПАРАТ ПИМАФУЦИН® КРЕМ

Всегда применяйте препарат в точном соответствии с рекомендациями врача или фармацевта.

В случае сомнений проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

Наносите тонкий слой крема на пораженные участки кожи 1-4 раза в день.

Продолжительность лечения обычно составляет 2-3 недели.

Лечение этим препаратом требует регулярных визитов к врачу, чтобы убедиться, что заболевание проходит.

Прерывание лечения кремом Пимафуцин®

Не прерывайте лечение без предварительной консультации с врачом. Если Вы прекратите применение препарата, симптомы могут вернуться.

Если Вы применили слишком много крема Пимафуцин®:

Если Вы нанесли слишком много крема, сотрите излишки. Если ребенок случайно проглотил содержимое упаковки препарата, обратитесь к врачу.

Если Вы забыли применить крем Пимафуцин®:

Если Вы забыли применить крем Пимафуцин®, нанесите его, как только вспомнили. Если подошло время следующего применения препарата, не применяйте двойную дозу для компенсации пропущенной.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Как и все другие лекарственные средства, данный препарат может вызывать побочные эффекты, однако они возникают не у всех пациентов.


Редкие побочные эффекты (могут возникать у до 1 из 1000 пациентов):

- Аллергические реакции в месте нанесения;
- Ощущение жжения и покалывания в месте нанесения.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе и на не перечисленные в данном листке-вкладыше.

Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о



неэффективности лекарственных препаратов, выявляемых в Республике Беларусь (<https://www.rceth.by>).

Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. КАК СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ ПРЕПАРАТ ПИМАФУЦИН® КРЕМ

Хранить при температуре 15-25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке. Датой истечения срока годности считается последний день указанного месяца.

Не выбрасывайте остатки неиспользованного препарата в канализацию или с бытовым мусором. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Препарат Пимафуцин® содержит:

Действующее вещество: натамицин. 1 г крема содержит 20 мг натамицина.

Вспомогательные вещества: децилолеат, воск цетилэфирный, цетостеариловый спирт, натрия лаурилсульфат, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, пропиленгликоль, вода очищенная.

Внешний вид и содержимое упаковки препарата Пимафуцин® крем

Крем для наружного применения. Крем от белого до светло-желтого цвета.

Первичная упаковка: По 30 г в алюминиевых или пластиковых тубах.

Вторичная упаковка: По 1 тубе вместе с инструкцией по применению в пачке картонной.

Условия отпуска из аптек

По рецепту

Держатель регистрационного удостоверения

ЧЕПЛАФАРМ Арцнаймиттель ГмбХ

Цигельхоф 24, 17489 Грайфсвальд, Германия

Сведения о производителе

Теммлер Италия С.р.Л.

Виа деле Индустри, 2

20061 Каругате (Ми), Италия

Данный листок-вкладыш пересмотрен

