

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

КАРСИЛ® 35 мг драже
CARSIL® 35 mg coated tablets
 силимарин (silymarin)


Прочтите внимательно весь листок-вкладыш, так как он содержит важную для Вас информацию.

Данный лекарственный препарат отпускается без рецепта. Однако, для получения наилучших результатов лечения Вам следует тщательно соблюдать инструкции по применению лекарственного препарата.

- Сохраните данный листок-вкладыш. У Вас может появиться необходимость прочитать его снова.
- Если Вам необходима дополнительная информация или совет, обратитесь к Вашему фармацевту.
- Вам следует обратиться к врачу, если Ваши симптомы ухудшаются или не наблюдается их улучшение.
- Если любое побочное действие становится серьезным или Вы заметите другие, не описанные в данном листке-вкладыше побочные действия, просим уведомить об этом Вашего врача или фармацевта.

В данном листке-вкладыше:

1. Что представляет собой Карсил и для чего используется
2. Перед приемом Карсил
3. Как принимать Карсил
4. Возможные побочные действия
5. Как хранить Карсил
6. Дополнительная информация



1. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КАРСИЛ И ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Карсил – лекарственный препарат, который содержит активное вещество силимарин, выделенное из плодов растения расторопши пятнистой. Силимарин активизирует синтез белков и фосфолипидов в поврежденных клетках печени, стабилизирует их клеточные мембраны, связывает свободные радикалы (антиоксидантное действие). Его основное действие заключается в защите клеток печени от вредных воздействий различных факторов, таких как алкоголь, лекарства, вирусные инфекции, промышленные загрязнители. При поражениях клеток печени он способствует их более быстрому восстановлению.

Используется для симптоматического лечения хронических токсических поражений печени, для поддерживающего лечения пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями печени и с циррозом печени.

2. ПЕРЕД ПРИЕМОМ КАРСИЛ

Не принимайте Карсил

- если у Вас аллергия (гиперчувствительность) к активному веществу или любому из вспомогательных веществ Карсил;

- детям младше 12 лет из-за отсутствия достаточного опыта применения у детей.

Обратите особое внимание при применении Карсил

- лечение Карсил не может заменить диету или воздержание от употребления алкоголя при печеночных поражениях;
- из-за возможного эстрогеноподобного действия применение у пациентов с гормональными нарушениями (эндометриоз, миома матки, карцинома молочной железы, яичников и матки, карцинома предстательной железы) должно происходить после консультации со специалистом.

Прием других лекарственных препаратов

Просим проинформировать Вашего врача или фармацевта, если Вы принимаете или недавно принимали другие лекарственные препараты, включая отпускаемые без рецепта. Карсил может уменьшить эффективность пероральных противозачаточных средств и лекарственных препаратов, которые используются при заместительном гормональном лечении.

Может усилить действие таких лекарственных препаратов, как диазепам, алпразолам, кетоконазол, ловастатин, винбластин.

Беременность и грудное вскармливание

Обратитесь за советом к Вашему врачу или фармацевту перед применением любого лекарства во время беременности и в период грудного вскармливания. Карсил можно принимать только по медицинским показаниям, если польза от лечения превышает риск применения препарата для плода или ребенка.

Управление транспортными средствами и работа с машинами

Карсил не оказывает неблагоприятного влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с машинами.

Важная информация о некоторых компонентах Карсил

- Лекарственный препарат содержит пшеничный крахмал. Карсил не представляет риска для людей с целиакией. Пациенты с аллергией на пшеницу (отличной от целиакии) не должны принимать это лекарство.
- Драже содержат в качестве вспомогательных веществ лактозу моногидрат и сахарозу. Если у Вас имеется непереносимость некоторых сахаров, посоветуйтесь с Вашим врачом перед применением данного лекарственного препарата.
- В состав оболочки входят метилпарагидроксибензоат (E218) и пропилпарагидроксибензоат (E216). Они могут вызвать аллергические реакции (возможно замедленного типа).

3. КАК ПРИНИМАТЬ КАРСИЛ


Драже принимают целиком, запивая достаточным количеством жидкости.

В отсутствие других указаний, взрослым и детям старше 12 лет рекомендуется принимать по 6 драже 3 раза в сутки.

Дети:

Нет достаточных данных об эффективности и безопасности силимарина у детей, поэтому Карсил не рекомендуется принимать детям младше 12 лет.

1981 - 2017

**Вспомогательные вещества:**

Ядро таблетки: лактоза моногидрат, пшеничный крахмал, повидон (Коллидон-25), микрокристаллическая целлюлоза, магния стеарат, тальк, глюкоза моногидрат, сорбитол, натрия гидрокарбонат.

Оболочка: целлюлозы ацетат фталат, диэтилфталат, сахароза, акации камедь, желатин, тальк, титана диоксид, макрогол 6000, Опалюкс AS 26586 коричневый (сахароза, очищенная вода, железа оксид красный (E172), железа оксид черный (E172), метилпарагидроксибензоат (E218), пропилпарагидроксибензоат (E216)), глицерол.

Как выглядит Карсил и что содержится в упаковке

Драже правильной круглой формы, коричневого цвета, без запаха.

10 драже упаковывают в блистер из твердой, бесцветной, прозрачной ПВХ пленки и алюминиевой фольги.

8 блистеров (80 драже) вместе с листком-вкладышем для потребителя помещают в картонную пачку.

Условия отпуска из аптечной сети: без рецепта.

Владелец разрешения на применение и производитель:

АО СОФАРМА

ул. Илиенское шоссе 16, 1220 София, Болгария

Дата последнего одобрения листка-вкладыша: Январь, 2017